

## 附件 4

# 说明书和标签

## 一、芬苯达唑混悬液说明书和标签

### (一) 芬苯达唑混悬液说明书

**兽用**

#### 【兽药名称】

通用名称：芬苯达唑混悬液

商品名称：浩克猛®

英文名称：Fenbendazole suspension

汉语拼音：Fenbendazuo Hunxuanye

#### 【主要成分】 芬苯达唑

【性状】 本品为白色或类白色混悬液。

【药理作用】 **药效学** 芬苯达唑属苯并咪唑类抗蠕虫药。细胞微管与细胞分裂、细胞形态的维持、细胞运动、细胞分泌、养分吸收和细胞内转运均有关，芬苯达唑可与寄生虫的 $\beta$ -微管蛋白结合，破坏微管蛋白和微管之间的动态平衡，进而在细胞水平上导致与微管结构有关的所有功能发生改变，最终使蠕虫因饥饿而死亡。

**药动学** 鸡内服本品后，只有少量芬苯达唑被吸收。芬苯达唑主要在肝脏中被迅速代谢成亚砷（奥芬达唑），并进一步代谢成砷（奥芬达唑砷）。在鸡体内，奥芬达唑砷 AUC 约占总 AUC（即芬苯达唑、奥芬达唑和奥芬达唑砷的 AUC 之和）的 3/4。芬苯达唑及其代谢产物在所有器官均有分布，肝脏中的浓度最高。芬苯达唑及其代谢产物主要经粪便排泄。

【适应证】 治疗鸡蛔虫（成虫阶段）和鸡异刺线虫（成虫阶段）感染。

【用法与用量】 以芬苯达唑计。混饮：每 1kg 体重，鸡 1mg（相当于 0.005ml 芬苯达唑混悬液），连用 5 日。

【不良反应】 按照推荐剂量使用，未见不良反应。

#### 【注意事项】

1. 使用前应充分摇匀。
2. 本品不得与其他兽药产品混合使用。
3. 未对小于 3 周龄的鸡进行安全性试验和临床试验，故小于 3 周龄的鸡应在兽医指导下使用本品。
4. 本品在推荐剂量下对鸡毛细线虫感染无效。
5. 所需药液需新鲜配制，首次开启后 3 个月内有效，配置后的药液可在室温下保存 24 小时。
6. 给药时，将计算后的每日所需用量加至 40%~80% 每日饮水量中，待含药水被饮用完后，尽快给予清水。
7. 本品应置于儿童不可触及处。
8. 对芬苯达唑过敏者请勿接触本品。
9. 摄入本品会对人体产生毒性，孕妇操作本品时需谨慎。
10. 使用本品时应佩戴手套，避免直接接触。避免皮肤、眼睛和黏膜接触本品，若不慎接触到皮肤或眼睛时应用大量清水冲洗，并及时就医。
11. 物流运输及存储过程中请勿冷冻并防止产品结冰。

12.未使用完的兽药及包材应进行无害化处理。本品对水生生物有害，不得将本品弃入河道。

**【休药期】** 鸡 6 日；弃蛋期 0 日。

**【规格】** 20%

**【包装】**

**【贮藏】** 密封保存

**【有效期】** 30 个月

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 保加利亚标伟特股份有限公司（Biovet Joint Stock Company）

地址：39, Petar Rakov Str., 4550 Peshtera, Bulgaria

## （二）芬苯达唑混悬液标签

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：芬苯达唑混悬液

商品名称：浩克猛®

英文名称：Fenbendazole suspension

汉语拼音：Fenbendazuo Hunxuanye

**【主要成分】** 芬苯达唑

**【性状】** 本品为白色或类白色混悬液。

**【适应证】** 治疗鸡蛔虫（成虫阶段）和鸡异刺线虫（成虫阶段）感染。

**【用法与用量】** 以芬苯达唑计。混饮：每 1kg 体重，鸡 1mg（相当于 0.005ml 芬苯达唑混悬液），连用 5 日。

**【规格】** 20%

**【进口兽药注册证号】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期】** 至

**【休药期】** 鸡 6 日；弃蛋期 0 日。

**【贮藏】** 密封保存

**【包装】**

**【生产企业】** 保加利亚标伟特股份有限公司（Biovet Joint Stock Company）

地址：39, Petar Rakov Str., 4550 Peshtera, Bulgaria

## 二、氟苯尼考注射液说明书和标签

### （一）氟苯尼考注射液说明书

**兽用处方药**

**【兽药名称】**

通用名称：氟苯尼考注射液  
商品名称：喜乐坦  
英文名称：Florfenicol Injection  
汉语拼音：Fubennikao Zhusheye

**【主要成分】** 氟苯尼考

**【性状】** 本品为微黄色的澄明溶液。

**【药理作用】** **药效学** 氟苯尼考属于酰胺醇类抗生素，对多种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌有较强的抗菌活性。通过竞争性结合细菌 70S 核糖体上的 50S 亚基，抑制肽酰基转移酶，从而抑制肽链的延伸，干扰细菌蛋白的合成。

**药动学** 猪首次肌内注射后，血药浓度约 2.2 小时达到峰值，为 1.9~3.1 $\mu$ g/ml，半衰期为 35.5 小时。第二次注射后，血药浓度约 1.7 小时达到峰值，为 2.0~8.1 $\mu$ g/ml。肺组织中的氟苯尼考浓度与血药浓度相同。氟苯尼考注射后代谢完全，通过尿液迅速排出体外。

**【适应证】** 用于治疗由胸膜肺炎放线杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪细菌性呼吸系统疾病。

**【用法与用量】** 以氟苯尼考计。颈部肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 15mg（即每 20kg 体重用本品 1ml），每 48 小时一次，连用 2 次。

**【不良反应】** 50%猪可能出现短暂的腹泻、肛门周围或直肠会出现红斑或水肿，持续一周。同时在注射部位观察到肿胀可持续 5 日，炎症病变可达 28 日。

**【注意事项】**

1.不得用于已知对氟苯尼考过敏的猪；不得用于成年种猪；不得用于体重不足 2kg 的仔猪；不得用于疫苗接种期或免疫功能严重缺陷猪。

2.体重大于 60kg 猪注射时，应分次给药以保证每个注射部位给药体积不超过 3ml，并精确称量体重以避免给药剂量不足。

3.肾功能不全患畜要减量或延长给药间隔时间。

4.氟苯尼考对怀孕母猪生殖安全性尚未进行研究。

5.本品使用应以药敏试验为依据，并考虑官方和当地的抗生素使用政策。若不按照说明书使用可能导致细菌对氟苯尼考耐药性的增加，且潜在的交叉耐药性会降低其他氯霉素类抗生素的治疗效果。

6.猪按 3 倍或以上推荐剂量给药后，可观察到采食和饮水减少、体重增长变缓、呕吐等症状。

7.对氟苯尼考过敏的使用者避免接触本品。使用中避免引入污染；避免意外的自我注射；避免接触眼睛和皮肤。如本品不慎接触眼睛和皮肤，应立即用清水冲洗。使用本品后应洗手。

8.避免将本品与其他兽药混用。

**【休药期】** 猪 18 日。

**【规格】** (1) 50ml:15g (2) 100ml:30g (3) 250ml:75g

**【包装】**

**【贮藏】** 遮光，25℃以下干燥保存。

**【有效期】** 24 个月；开启后 28 日。

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂（Laboratorios HIPRA, S.A.）

地址：Avda. La Selva, 135-17170 Amer（Girona），Spain

## （二）氟苯尼考注射液标签

兽用处方药

### 【兽药名称】

通用名称：氟苯尼考注射液  
商品名称：喜乐坦  
英文名称：Florfenicol Injection  
汉语拼音：Fubennikao Zhusheye

【主要成分】 氟苯尼考

【性状】 本品为微黄色的澄明溶液。

【适应证】 用于治疗由胸膜肺炎放线杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪细菌性呼吸系统疾病。

【用法与用量】 以氟苯尼考计。颈部肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 15mg（即每 20kg 体重用本品 1ml），每 48 小时一次，连用 2 次。

【规格】 （1）50ml:15g （2）100ml:30g （3）250ml:75g

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 猪 18 日。

【贮藏】 遮光，25℃ 以下干燥保存。

【包装】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂（Laboratorios HIPRA, S.A.）  
地址：Avda. La Selva, 135-17170 Amer（Girona），Spain

## 三、非罗考昔咀嚼片说明书和标签

### （一）非罗考昔咀嚼片说明书

宠物用

### 【兽药名称】

通用名称：非罗考昔咀嚼片  
商品名称：普维康（Previcox）  
英文名称：Firocoxib Chewable Tablets  
汉语拼音：Feiluokaoxi Jujuepian

【主要成分】 非罗考昔

【性状】 本品为棕褐色刻痕片。

【药理作用】 **药效学** 非罗考昔是一种非甾体类抗炎药，可通过选择性抑制环氧酶-2（COX-2）介导的前列腺素合成，从而发挥解热、镇痛和抗炎作用。在犬体外的全血检测中，非罗考昔对 COX-2 的选择性约为 COX-1 的 380 倍。

**药动学** 犬以 5mg/kg 体重的剂量内服给药后，迅速吸收，生物利用度达 36.9（±20.4）%，达峰时间（ $T_{max}$ ）为 1.25（±0.85）小时，峰浓度（ $C_{max}$ ）为 0.52（±0.22） $\mu\text{g/ml}$ 。非罗考昔与血浆蛋白质结合率约为 96%。半衰期（ $t_{1/2}$ ）为 7.59（±1.53）小时。非罗考昔主要在肝脏内经脱烷基化及葡糖醛酸化代谢，并通过胆汁及胃肠道消除。

**【适应症】** 用于缓解犬骨关节炎及临床手术等引起的疼痛和炎症。

**【用法与用量】** 以非罗考昔计。内服：每 1kg 体重，犬 5mg，每日一次。用于缓解临床手术等引起的疼痛和炎症时，动物可在手术前约 2 小时开始给药，连续给药 3 日，可根据兽医的建议按相同剂量继续给药。具体见下表。

体重 (kg)	各规格片剂所用数量	
	57mg	227mg
3.0~5.5	0.5	
5.6~10	1	
10.1~15	1.5	
15.1~22		0.5
22.1~45		1
45.1~68		1.5
68.1~90		2

**【不良反应】**

1. 偶见短暂的呕吐和腹泻，停药后可恢复正常。推荐剂量下，犬罕见（发生率 1/10000~10/10000）发生神经系统紊乱，十分罕见（发生率 < 1/10000）发生肝肾功能紊乱。

2. 与其他非甾体类抗炎药相同，可能会发生严重不良反应，在十分罕见的情况下，可能是致命的。

**【注意事项】**

1. 不得用于怀孕或哺乳期母犬。

2. 不得用于 10 周龄以下或体重不足 3kg 的犬。

3. 不得用于患有消化道出血、血液恶液质或者出血性疾病的犬；不得用于任何脱水、血容量减少或低血压的犬。

4. 不得与皮质激素类或其他非甾体类抗炎药联合使用；不得与其他潜在的具有肾脏毒性的药物同时使用。

5. 如果出现以下任何反应停止治疗：反复腹泻、呕吐、粪便潜血、体重突然减轻、厌食、嗜睡、肝肾生化指标下降等。

6. 由于麻醉药物可能会影响肾脏的血流灌注，因此在手术过程中应考虑使用静脉输液，以减少在围手术期使用本品导致的潜在肾脏并发症。

7. 本品应避免与其他高血浆蛋白结合率的药物联合使用，以免发生竞争结合血浆蛋白，使游离的药物浓度增高而出现不良反应。

8. 本品的田间试验最长疗程为 90 日，如需更长疗程，需经兽医评估后使用。

9. 咀嚼片可单独喂食，也可与食物一同给药。

10. 将未使用的半片放回原包装内，最多保存 7 日。

11. 勿超剂量使用。

12. 使用本品后应洗手。

13. 本品应存放于儿童不可触及处。

**【休药期】** 无需制定。

**【规格】** (1) 57mg (2) 227mg

**【包装】**

【贮藏】 密封，30℃以下保存。

【有效期】 48个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂（Boehringer Ingelheim Animal Health France）

地址：4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

## （二）非罗考昔咀嚼片标签

**宠物用**

【兽药名称】

通用名称：非罗考昔咀嚼片

商品名称：普维康（Previcox）

英文名称：Firocoxib Chewable Tablets

汉语拼音：Feiluokaoxi Jujuepian

【主要成分】 非罗考昔

【性状】 本品为棕褐色刻痕片。

【适应证】 用于缓解犬骨关节炎及临床手术等引起的疼痛和炎症。

【用法与用量】 以非罗考昔计。内服：每1kg体重，犬5mg，每日一次。用于缓解临床手术等引起的疼痛和炎症时，动物可在手术前约2小时开始给药，连续给药3日，可根据兽医的建议按相同剂量继续给药。具体见下表。

体重（kg）	各规格片剂所用数量	
	57mg	227mg
3.0~5.5	0.5	
5.6~10	1	
10.1~15	1.5	
15.1~22		0.5
22.1~45		1
45.1~68		1.5
68.1~90		2

【规格】 （1）57mg （2）227mg

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密封，30℃以下保存。

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂（Boehringer Ingelheim

Animal Health France)

地址：4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

## 四、托曲珠利标签

**兽用**

### 【兽药名称】

通用名称：托曲珠利

英文名称：Toltrazuril

汉语拼音：Tuoquzhuli

【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭。

### 【包装】

### 【生产日期】

### 【生产批号】

### 【有效期】 至

### 【运输注意事项】

【贮藏】 遮光，密封，在阴凉干燥处保存。

### 【进口兽药注册证号】

【生产企业】 KVP Kiel 有限责任公司（KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH）

地址：Projensdorfer Straße 324, 24106, Kiel, Germany

## 五、烯丙孕素内服溶液说明书和标签

### （一）烯丙孕素内服溶液说明书

**兽用**

### 【兽药名称】

通用名称：烯丙孕素内服溶液

商品名称：维保同®（Virbages）

英文名称：Altrenogest Oral Solution

汉语拼音：Xibingyunsu Neifurongye

【主要成分】 烯丙孕素。

【性状】 本品为浅黄色澄清油状液体。

【药理作用】 药效学 性激素类药。烯丙孕素与天然黄体酮的作用类似。给药期间能够抑制脑垂体分泌促性腺激素，阻止卵泡发育及发情；给药结束后，脑垂体恢复分泌促性腺激素，促进卵泡发育与发情。停药时卵泡发育程度一致，加上促性腺激素的分泌同步恢复，促使所有动物在停药 5~8 日后同期发情。

药动学 本品在胃肠道迅速吸收。首次给药 1 小时后达到血药浓度的峰值，第 18 次给药约 4 小时后达到血药浓度峰值。烯丙孕素主要经肝脏代谢，通过胆汁排出。消除半衰期约 14 个小时。

**【适应证】** 用于控制后备母猪同期发情。

**【用法与用量】** 以烯丙孕素计。直接用 5ml 喷头饲喂或喷洒在饲料上内服，一次量，后备母猪 20mg（5ml），连用 18 日。

**【注意事项】**

- 1.仅用于至少发情过一次的性成熟的母猪。
- 2.每头动物单独给药，确保每日给药剂量。
- 3.有急性、亚急性、慢性子宫内膜炎的母猪慎用。
- 4.操作时应穿戴防护服和手套，操作后和用餐前应洗手。
- 5.妊娠和育龄妇女应避免接触本品，如须操作应非常小心。意外接触可能导致月经紊乱或妊娠期延长，所以应尽量避免皮肤直接接触，如意外渗漏至皮肤，应立即用肥皂和水清洗。

**【不良反应】** 给药量不足可能导致卵泡囊肿。

**【休药期】** 猪 9 日。

**【规格】** 0.4%

**【包装】** （1）450ml （2）900ml

**【贮藏】** 遮光，密闭保存。

**【有效期】** 36 个月。瓶子开启后 60 日内有效。

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 法国维克有限公司（Virbac）

地址：1 ERE AVENUE 2065 MLID, 06510 CARROS, FRANCE

## （二）烯丙孕素内服溶液标签

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：烯丙孕素内服溶液

商品名称：维保同®（Virbagesst）

英文名称：Altrenogest Oral Solution

汉语拼音：Xibingyunsu Neifurongye

**【主要成分】** 烯丙孕素。

**【性状】** 本品为浅黄色澄清油状液体。

**【适应证】** 用于控制后备母猪同期发情。

**【用法与用量】** 以烯丙孕素计。直接用 5ml 喷头饲喂或喷洒在饲料上内服，一次量，后备母猪 20mg（5ml），连用 18 日。

**【规格】** 0.4%

**【进口兽药注册证号】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期】** 至

**【休药期】** 猪 9 日。

**【贮藏】** 遮光，密闭保存。

**【包装】** （1）450ml （2）900ml

【生产企业】 法国维克有限公司 (Virbac)

地址: 1 ERE AVENUE 2065 MLID, 06510 CARROS, FRANCE

## 六、氨基丁三醇前列腺素 F<sub>2α</sub> 标签

兽用

### 【兽药名称】

通用名称: 氨基丁三醇前列腺素 F<sub>2α</sub>

英文名称: Prostaglandin F<sub>2α</sub> Tromethamine

汉语拼音: Anjidingsanchun Qianliexiansu F<sub>2α</sub>

【性状】 本品为白色或类白色粉末; 有引湿性。

【包装】

【有效期】 至

【贮藏】 冷处 (2°C~8°C) 保存。

【运输注意事项】

【生产日期】

【生产批号】

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 欧宜平匈牙利有限公司 (EUROAPI Hungary Ltd.)

地址: Tó utca 1-5, H-1045 Budapest, Hungary

## 七、猪伪狂犬病活疫苗 (Bartha K-61 株) 说明书和标签

### (一) 猪伪狂犬病活疫苗 (Bartha K-61 株) 说明书

兽用

### 【兽药名称】

通用名称: 猪伪狂犬病活疫苗 (Bartha K-61 株)

商品名称: 喜可净

英文名称: Swine Pseudorabies Vaccine, Live (Strain Bartha K-61)

汉语拼音: Zhu Weikuanguanbing Huoyimiao (Bartha K-61 Zhu)

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含猪伪狂犬病病毒 Bartha K-61 株至少 10<sup>5.5</sup>TCID<sub>50</sub>。

【性状】 黄白色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。

【用法与用量】 可采用颈部肌肉注射或滴鼻途径进行接种。所有年龄、体重和性别的猪均接种 2ml (含 1 头份)。

采用肌肉注射途径进行接种时, 可以用红色稀释液 (W) 或白色稀释液 (A3) 稀释后进行接种; 采用滴鼻途径进行接种时, 用红色稀释液稀释后, 每个鼻孔接种 1ml。

**推荐的接种程序:**

**育肥猪:** 在一般地区使用时, 每头猪于 12~13 周龄时接种 1 头份 (2ml); 在流行地区

使用时，每头猪于 10~11 周龄时接种 1 头份，13~14 周龄时再接种 1 头份。

**种猪：**以 3~4 周的时间间隔接种 2 次，此后，每隔 4 个月再接种 1 次，或在每次分娩前 4~6 周再接种 1 次。

在进行紧急接种时，对所有猪（包括母猪、公猪和仔猪）均接种 1 头份。

**【不良反应】** 一般无可见的不良反应。

**【注意事项】** 1.仅用于接种健康猪。

2.疫苗应避光保存，不要冷冻。

3.使用前应使疫苗充分溶解。

4.疫苗稀释后，应在 1 小时内用完。

5.注射时，应使用灭菌注射器和针头，并采用常规无菌操作方法。

6.用过的疫苗瓶器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

**【规格】** (1) 10 头份/瓶 (2) 25 头份/瓶 (3) 50 头份/瓶 (4) 100 头份/瓶

**【包装】** (1) 1 瓶/盒 (2) 10 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 30 个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

地址：Avda. La Selva, 135. 17170—Amer (Girona) Spain

电话：0034972430660

传真：0034972430061

**仅在兽医指导下使用**

## （二）猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K-61 株）标签

**兽用**

**喜可净**

**猪伪狂犬病活疫苗（Bartha K-61 株）**

10（25、50、100）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

**【作用与用途】** 用于预防猪伪狂犬病。

**【用法与用量】** 采用颈部肌肉注射或滴鼻途径进行接种。每头猪 2ml（含 1 头份）。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 30 个月。

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

**仅在兽医指导下使用**

## 八、猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（支气管败血波氏杆菌 833CER 株+D 型多杀性巴氏杆菌毒素）说明书和标签

（一）猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（支气管败血波氏杆菌 833CER 株+D 型多杀性巴氏杆菌毒素）说明书

**兽用**

### 【兽药名称】

通用名称：猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（支气管败血波氏杆菌 833CER 株+D 型多杀性巴氏杆菌毒素）

商品名称：瑞立胜<sup>®</sup>

英文名称：Inactivated vaccine to prevent progressive and non-progressive atrophic rhinitis in pigs

汉语拼音：Zhu Weisuoxingbiyan Miehuoyimiao (Zhiqiguanbaixueboshiganjun 833CER Zhu+D xing Duoshaxingbashiganjundusu)

【主要成分和含量】 每头份（2ml）含灭活的支气管败血波氏杆菌 833CER 株 9.62~9.98 BbCC，含重组 D 型多杀性巴氏杆菌毒素至少 1 个鼠有效剂量（1MED<sub>70</sub>）。

BbCC：支气管败血波氏杆菌计数（log<sub>10</sub> 对数转化值）

1MED<sub>70</sub>：对小鼠皮下接种 5 倍稀释的疫苗 0.2ml，可以使至少 70% 的小鼠出现血清阳转。

【性状】 静置后，上层为灰白色至淡黄色液体，下层为白色至淡黄色沉淀，振荡后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于接种母猪和后备母猪，预防所产仔猪由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的进行性和非进行性猪萎缩性鼻炎。

【用法与用量】 用于母猪和后备母猪，颈部肌肉注射，每头每次接种 1 头份（2ml）。推荐采用下列接种程序：

基础免疫 未曾接种过该疫苗的母猪和后备母猪需进行 2 次接种，在预产期前 6~8 周首免，间隔 3~4 周再接种 1 次。

加强免疫 以后每次分娩前 3~4 周再接种 1 次。

【不良反应】 疫苗接种后，注射位点可能会出现一过性轻度肿胀；直肠温度升高偶尔达到 1.5℃，不需处理，24 小时内可恢复正常。

【注意事项】 1. 仅用于接种健康猪。

2. 严禁冻结，避光保存。

3. 用前应充分摇匀，并恢复至室温（15~25℃）。

4. 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

5. 接种时，应按常规的无菌操作方法进行。

【规格】 （1）10 头份（20ml）/瓶 （2）25 头份（50ml）/瓶 （3）50 头份（100ml）/瓶  
（4）125 头份（250ml）/瓶

【包装】 玻璃瓶：（1）1 瓶/盒 （2）10 瓶/盒

塑料瓶：（1）1 瓶/盒 （2）10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

地址：Avda. La Selva, 135. 17170 - Amer (Girona) Spain

**仅在兽医指导下使用**

（二）猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（支气管败血波氏杆菌 833CER 株+D 型多杀性巴氏杆菌毒素）标签

**兽用**

**瑞立胜®**

**猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（支气管败血波氏杆菌 833CER 株+D 型多杀性巴氏杆菌毒素）**

10（25、50、125）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

**【作用与用途】** 用于接种母猪和后备母猪，预防所产仔猪由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的进行性和非进行性猪萎缩性鼻炎。

**【用法与用量】** 颈部肌肉注射，每头每次接种 1 头份（2ml）。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

**仅在兽医指导下使用**